



Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BAMSar

Bollettino Agro-Meteo della Sardegna

Bollettino n. 10 del 2026

Periodo validità: 02 - 08 ottobre 2026

Area G

ZONA DI VIGILANZA ARPAS - Logudoro

Montiferru - Montacuto - Meilogu-Sassarese-Anglona - Nurra

Indice Colture

OLIVO

VITE

CARCIOFO

FRAGOLA

PATATA

CARCIOFO



Fasi fenologiche

Copertura del terreno 50-80%

Copertura del terreno < 50%



**Pratiche
agronomiche**

- Razionalizzare gli interventi irrigui e le concimazioni azotate

Afidi del cardo e del carciofo



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrice

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Le infestazioni di afidi devono essere controllate tempestivamente alla comparsa dei primi focolai. il contenimento di questi insetti è importante in quanto vettori delle principali virosi del carciofo.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Maltodestrina		UN	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			

Marciume del colletto del carciofo



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

MEDIO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche (specifiche avversità)

Segnaliamo diffusi attacchi del patogeno. E' registrato anche il Bacillus subtilis per trattamenti fogliari. Il Trichoderma va distribuito in fertirrigazione con temperature inferiori ai 28° C. Ripetere il trattamento dopo circa 10 giorni.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma asperellum	BM02	BM	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma gamsii	BM02	BM	

Pratiche agronomiche

- Estirpare le piante sospette o infette

Nottue fogliari su carciofo



Scelta fitosanitaria

Bassa pressione dell'avversità

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nelle carciofaie anticipate, sono attive
larve di Nottue ai primi stadi di sviluppo.
Intervenire con insetticidi da contatto.
solo al raggiungimento della soglia
d'intervento.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cipermetrina	3A	PIR	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	



Fasi fenologiche

Pretrapianto - Trapianto

Affrancamento

Pratiche agronomiche

- Avviate le operazioni preliminari finalizzate alla messa a dimora delle piante a cima radicata, propedeutiche all'avvio della prossima stagione produttiva fragolicola

Marciume radicale della fragola

Scelta fitosanitaria

Forte presenza anni precedenti

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Vista la presenza negli anni precedenti, sarebbe meglio effettuare un controllo accurato delle nuove piantine, coadiuvati dai tecnici Laore, e ove necessario intervenire con trattamenti mirati al trapianto.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma spp.	BM02	BM	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Metalaxil-M	4	A1	

Fasi fenologiche

2a fase ingrossamento drupe

Inizio invaiatura



Pratiche agronomiche

• Spollonatura

Mosca dell'olivo



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali sfavorevoli

Scelta fitoiatrica

Intervento NON consigliato

**Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)**

Nelle strategie di lotta alternativa alla mosca con repellenti naturali (caolino, zeoliti ...) mantenere la copertura della chioma associando alla polvere il rame, sia per potenziare l’ azione repellente sia per mantenere l’azione anticrittogamica

Pratiche agronomiche

- Monitorare la dinamica della popolazione adulta ed in particolare delle femmine



Fasi fenologiche

Comparsa foglie n° 1 - 3

Comparsa foglie n° 4 - 9

**Pratiche
agronomiche**

- Effettuare frequenti rincalzature
- Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni



Diserbo Graminacee e Dicotiledoni Patata

Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Per chi non avesse ancora provveduto,
intervenire con il diserbo di pre-
emergenza

rispettando scrupolosamente le
indicazioni in etichetta ministeriale del
formulato scelto.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clomazone	13	F4	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Pendimethalin	3	K1	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Diflufenican	12	F1	

Peronospora della patata



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nel nostro areale la malattia non è ancora comparsa ma le irrigazioni a pioggia, l'umidità notturna e gli sbalzi termici potrebbero favorirne lo sviluppo. Monitorare con attenzione la coltura e nel caso intervenire con un prodotto di copertura.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Prodotti rameici	M1	M	

Fasi fenologiche

Caduta foglie

Maturazione



Indicazioni Tecniche (generali coltura)

Effettuare una ripuntatura per eliminare la compattazione del terreno dovuta ai ripetuti passaggi dei mezzi durante il ciclo produttivo, favorendo l'areggiamento del suolo, l'attività radicale ed un miglioramento della capacità di ritenzione idrica.

Cocciniglie



Scelta fitosanitaria

Bassa pressione dell'avversità

Scelta fitoiatrica

Intervento NON consigliato

Pratiche agronomiche

- Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.

Link Utili

Arpa Sardegna

Portale regionale che offre accesso online a servizi amministrativi e pratiche digitali, semplificando i procedimenti e promuovendo trasparenza e digitalizzazione per cittadini, imprese e istituzioni.

Guida all'uso dei prodotti fitosanitari

Fornisce indicazioni per un impiego sicuro e responsabile dei fitosanitari, promuovendo la tutela della salute, dell'ambiente e la gestione sostenibile delle colture.

Controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici

Disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei fitosanitari, assicurando efficienza, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.

Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Certifica pratiche agricole sostenibili attraverso regole e controlli che limitano l'uso di prodotti fitosanitari e garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tutela ambientale.

Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 2026

Definiscono le norme tecniche per una gestione agricola sostenibile, regolando fertilizzazione, difesa fitosanitaria e pratiche colturali per ridurre l'impatto ambientale e assicurare produzioni di qualità.

Legenda tipologia sostanze attive



Sostanze attive ammesse in Agricoltura Biologica



Sostanze attive ammesse in Produzione Integrata