



Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BAMSar

Bollettino Agro-Meteo della Sardegna

Bollettino n. 2 del 2026

Periodo validità: 31 luglio - 06 agosto 2026

Area G

ZONA DI VIGILANZA ARPAS - Logudoro

Montiferru - Montacuto - Meilogu-Sassarese-Anglona - Nurra

Indice Colture

OLIVO

VITE

ANGURIA

CARCIOFO

MELONE

POMODORO



Fasi fenologiche

Ingrossamento del frutto

Maturazione frutto

Afidi su anguria



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Vista l'imminente raccolta, prestare attenzione agli intervalli di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flupyradifurone	4D	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Aleurodidi su anguria



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrice

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Vista l'imminente raccolta, fare attenzione agli intervalli di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina A	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flonicamid	29	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Ragnetto rosso su anguria



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Vista l'imminente raccolta, fare attenzione agli intervalli di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Abamectina		6	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Beauveria bassiana		BM02	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Exitiazox	10A	RC	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			

CARCIOFO



Fasi fenologiche

Comparsa foglie n° 4 - 6

Emergenza



Pratiche agronomiche

- In fase di impianto della carciofaia, prestare attenzione nella scelta del materiale di propagazione, evitando di reperirlo presso impianti che hanno avuto problemi fitosanitari nella precedente annata.

Indicazioni Tecniche (generalicoltura)

Ricordiamo di usare la massima attenzione nell'utilizzo dei diserbanti in post-trapianto,

attenendosi alle indicazioni delle etichette. I tecnici Laore della UOTT Produzioni Vegetali di Sassari sono disponibili per qualsiasi chiarimento in merito.

Nottue terricole su carciofo



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Raggiunta soglia di intervento

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nelle carciofaie anticipate dell’areale del Coros, sulle piante che presentano almeno 3 foglie, sono attive le larve di Agrotidi ai primi stadi di sviluppo. Intervenire con insetticidi da contatto solo al raggiungimento della soglia d'intervento.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cipermetrina	3A	PIR	

MELONE



Fasi fenologiche

Ingrossamento del frutto

Maturazione frutto

Afidi su melone



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Vista l'imminente raccolta, prestare attenzione agli intervalli di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina A	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flonicamid	29	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Aleurodidi su melone



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Visto l'imminente periodo di raccolta,
prestare attenzione agli intervalli di
sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina A	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flonicamid	29	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Ragnetto rosso su melone



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Visto l'imminente periodo di raccolta,
prestare attenzione agli intervalli di
sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Abamectina		6	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Exitiazox	10A	RC	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Maltodestrina		UN	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			

Fasi fenologiche

2a fase ingrossamento drupe



Pratiche agronomiche

• Spollonatura

Mosca dell'olivo



Scelta fitosanitaria Condizioni ambientali sfavorevoli

Scelta fitoiatrica Intervento NON consigliato

**Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)** Nelle strategie di lotta alternativa alla mosca con repellenti naturali (caolino, zeoliti ...) provvedere al trattamento di copertura della chioma associando alla polvere il rame sia per potenziare l’azione repellente sia per l’azione anticrittogamica

Pratiche agronomiche • Monitorare la dinamica della popolazione adulta ed in particolare delle femmine



Fasi fenologiche

Invaiaatura 3° palco

Maturazione 3° palco

Eriofide del pomodoro



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrice

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

E' possibile utilizzare anche i Sali potassici di acidi grassi e la Maltodestrina, sostanze attive con intervallo di sicurezza (PHI) = 0 giorni.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Milbemectina	6	NT	

Nottue fogliari su pomodoro



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Raggiunta soglia di intervento

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

La coltura è nella fase di maturazione e raccolta. In caso di raggiungimento della soglia d'intervento, valutare con cura l'intervallo di sicurezza del formulato insetticida scelto.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina	Sconosciuto	Sconosciuto	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Spinosad	5	NT	

Tignola del pomodoro



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Raggiunta soglia di intervento

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nelle stazioni di monitoraggio la presenza dell’insetto è costante, consigliamo di intervenire utilizzando insetticidi endoterapici specifici oppure Bacillus thuringiensis. Vista la fase fenologica, valutare con cura l'intervallo di sicurezza (PHI).

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Fasi fenologiche

Invaiaatura



Indicazioni Tecniche (generali coltura)

Irrigare sino alla fase di completa invaiatura. In alternativa eseguire delle lavorazioni superficiali del terreno per limitare la perdita d'acqua per capillarità. Utile l'utilizzo di polveri di roccia e alghe per limitare lo stress termico.

Cocciniglie



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Lavaggi con Sali Potassici di acidi grassi per eliminare la melata, facendo seguire un intervento insetticida con formulati sistemici specifici o con Olio minerale estivo, avendo cura di distribuire i formulati in purezza e nelle ore più fresche.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flupyradifurone	4D	NT	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio minerale	NC	NC	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Pyriproxyfen	7C	RC	

Mal dell'esca



Scelta fitosanitaria Effettuare monitoraggio aziendale: NON Raggiunta soglia di intervento

Scelta fitoiatrica Intervento NON consigliato

Indicazioni tecniche (specifiche avversità) individuare e segnalare le piante che mostrano i sintomi della malattia, su cui si interverrà durante la potatura invernale eliminando le parti infette o l’intera pianta.

Muffa grigia della vite



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrice

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Sulle varietà più sensibili e/o a grappolo compatto, in presenza di lesioni sugli acini dovute ad infezioni oidiche o ad infestazione di tignole, è necessario intervenire sulla fascia produttiva.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus subtilis	F6		

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fenexamid	17	G3	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Isofetamid	7	C2	

Tignola rigata



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Raggiunto il picco di cattura nelle
trappole a feromone, è necessario
intervenire bagnando accuratamente la
fascia produttiva con un formulato
specifico.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Link Utili



Arpa Sardegna

Portale regionale che offre accesso online a servizi amministrativi e pratiche digitali, semplificando i procedimenti e promuovendo trasparenza e digitalizzazione per cittadini, imprese e istituzioni.



Guida all'uso dei prodotti fitosanitari

Fornisce indicazioni per un impiego sicuro e responsabile dei fitosanitari, promuovendo la tutela della salute, dell'ambiente e la gestione sostenibile delle colture.



Controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici

Disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei fitosanitari, assicurando efficienza, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.



Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Certifica pratiche agricole sostenibili attraverso regole e controlli che limitano l'uso di prodotti fitosanitari e garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tutela ambientale.



Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 2026

Definiscono le norme tecniche per una gestione agricola sostenibile, regolando fertilizzazione, difesa fitosanitaria e pratiche colturali per ridurre l'impatto ambientale e assicurare produzioni di qualità.

Legenda tipologia sostanze attive



Sostanze attive ammesse in Agricoltura Biologica



Sostanze attive ammesse in Produzione Integrata