



Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupp in agricultura



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BAMSar

Bollettino Agro-Meteo della Sardegna

Bollettino n. 7 del 2026

Periodo validità: 11 - 17 settembre 2026

Area G

ZONA DI VIGILANZA ARPAS - Logudoro

Montiferru - Montacuto - Meilogu-Sassarese-Anglona - Nurra

Indice Colture

OLIVO

VITE

CARCIOFO

FINOCCHIO

Fasi fenologiche

Copertura del terreno < 50%

Copertura del terreno 50-80%



**Pratiche
agronomiche**

- Razionalizzare gli interventi irrigui e le concimazioni azotate

Afidi del cardo e del carciofo



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Acetamiprid	4A	NT	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Lambda-cialotrina	3A	PIR	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Maltodestrina		UN	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			

Marciume del colletto del carciofo



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Distribuire il formulato a base di triconderma con temperature inferiori ai 28° C, preferibilmente in fertirrigazione. Ripetere il trattamento dopo circa 10 giorni.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma asperellum	BM02	BM	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flutolanil	7	C2	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma gamsii	BM02	BM	

Nottue fogliari su carciofo



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nelle carciofaie anticipate, sono attive
larve di Nottue ai primi stadi di sviluppo.
Intervenire con insetticidi da contatto.
solo al raggiungimento della soglia
d'intervento.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cipermetrina	3A	PIR	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Nottue terricole su carciofo



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Raggiunta soglia di intervento

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nelle carciofaie anticipate sono attive
larve di Agrotidi ai primi stadi di
sviluppo. Intervenire con insetticidi da
contatto solo al raggiungimento della
soglia d'intervento.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Cipermetrina	3A	PIR	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Spinosad	5	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Teflutrin	3A	PIR	

Fasi fenologiche

Trapianto

Sviluppo fogliare



Moria delle piantine del finocchio



Scelta fitosanitaria Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche (specifiche avversità) Distribuire il formulato con temperature inferiori ai 28° C, preferibilmente in fertirrigazione. Ripetere il trattamento dopo circa 10 giorni.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma asperellum	BM02	BM	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma spp.	BM02	BM	

Nottue su finocchio



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva (da usare combinati)	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina	Sconosciuto	Sconosciuto	
Lambda-cialotrina	3A	PIR	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Spinosad	5	NT	

Fasi fenologiche

2a fase ingrossamento drupe



Pratiche agronomiche

- Spollonatura

Indicazioni Tecniche (generali coltura)

Prestare molta attenzione quando le temperature scenderanno sotto i 32°C con forti escursioni tra notte e giorno perché potrebbe partire un attacco di mosca. L'infestazione attiva ora è prossima allo zero. Fare irrigazioni di soccorso se possibile

Mosca dell'olivo



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali sfavorevoli

Scelta fitoiatrica

Intervento NON consigliato

**Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)**

Nelle strategie di lotta alternativa alla mosca con repellenti naturali (caolino, zeoliti ...) mantenere la copertura della chioma associando alla polvere il rame, sia per potenziare l’ azione repellente sia per mantenere l’azione anticrittogamica

Pratiche agronomiche

- Monitorare la dinamica della popolazione adulta ed in particolare delle femmine

Fasi fenologiche

Maturazione



Pratiche agronomiche

- Garantire l'arieggiamento della fascia produttiva liberando i grappoli dalla vegetazione che ostacola la circolazione di aria e luce

Indicazioni Tecniche (generalì coltura)

La vendemmia procede in tutti gli areali viticoli, la maggior parte delle uve a maturazione precoce sono state raccolte, mentre per le varietà più tardive si è iniziata la vendemmia che si dovrebbe concludere entro il mese di Settembre.

Cicaline della vite



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

**Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)**

Intervenire soprattutto nei giovani
impianti per salvaguardare l'apparato
fogliare e garantire una completa
lignificazione dei tralci.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flupyradifurone	4D	NT	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			

Cocciniglie



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

**Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)**

Intervenire in post vendemmia prima che l'insetto migri verso gli organi legnosi per lo svernamento, preferibilmente in tarda serata interessando la parte medio alta del ceppo sino alla fascia produttiva, utilizzando volumi di 800-1000 litri di acqua

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio minerale	NC	NC	

Pratiche agronomiche

- Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.

Muffa grigia della vite



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

In caso di vendemmia tardiva si consiglia
di mantenere la copertura.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus subtilis	F6		

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Aureobasidium pullulans			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Pythium oligandrum		BM02	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Trichoderma asperellum	BM02	BM	

Oidio della vite



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali favorevoli

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Intervenire in post vendemmia nei vigneti che sono stati interessati da importanti infezioni oidiche, al fine di ridurre la carica di inoculo (casmoteci) destinato a svernare.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Ampelomyces quisqualis	BIO	BM02	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Zolfo	M2	M	

Link Utili

Arpa Sardegna

Portale regionale che offre accesso online a servizi amministrativi e pratiche digitali, semplificando i procedimenti e promuovendo trasparenza e digitalizzazione per cittadini, imprese e istituzioni.

Guida all'uso dei prodotti fitosanitari

Fornisce indicazioni per un impiego sicuro e responsabile dei fitosanitari, promuovendo la tutela della salute, dell'ambiente e la gestione sostenibile delle colture.

Controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici

Disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei fitosanitari, assicurando efficienza, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.

Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Certifica pratiche agricole sostenibili attraverso regole e controlli che limitano l'uso di prodotti fitosanitari e garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tutela ambientale.

Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 2026

Definiscono le norme tecniche per una gestione agricola sostenibile, regolando fertilizzazione, difesa fitosanitaria e pratiche colturali per ridurre l'impatto ambientale e assicurare produzioni di qualità.

Legenda tipologia sostanze attive



Sostanze attive ammesse in Agricoltura Biologica



Sostanze attive ammesse in Produzione Integrata