



Notiziario fitosanitario

N. 290/ATO2/2025

Valido dal

19/12



al

08/01/2026



[Sportello Unico Territoriale per l'area del Coros](#)
[Sportello Unico Territoriale per l'area del Meilogu](#)
[Sportello Unico Territoriale per l'area della Nurra](#)
[Sportello Unico Territoriale per l'area della Romangia](#)
[Sassarese](#)

[Sassari via Baldedda, 11 - tel. 079 25581,](#)
[Thiesi via Medaglia D'Oro De Martini, 34 - tel. 079 25585600](#)
[Alghero via XX Settembre, 7 - tel 079 25585000](#)
[Sassari via Baldedda, 11 - tel 079 25581,](#)

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo **cellulare**
www.sardegnaagricoltura.it

[Info sul web](#)

Consigli culturali e difesa

Carciofo



Fase fenologica: levata e maturazione dei capolini primari, secondari e di terzo ordine

Botrite (*Botrytis cinerea*): per via delle temperature minime elevate per il periodo, non riscontriamo infezioni significative. Tuttavia è probabile un rapido calo termico, per cui in presenza dei primi sintomi, consigliamo di monitorare la coltura e di ricorrere a trattamenti con antibotritici registrati per il carciofo, valutando con attenzione l'intervallo di sicurezza del prodotto fitosanitario.

Peronospora (*Bremia lactucae*): la malattia, favorita dall'elevata umidità e dalle temperature miti, è ancora presente anche se rallentata dalle temperature minime notturne. Solo per le produzioni tardive consigliamo di mantenere la protezione antiperonosporica, utilizzando formulati ad azione sistemica e/o endoterapica solo dove la malattia è realmente attiva. Anche in questo caso, prestare massima attenzione all'intervallo di sicurezza dei formulati impiegati.

Molluschi: rileviamo costanti infestazioni con percentuali molto variabili di piante e capolini attaccati. Sono presenti sia le limacce che le chiocciola e le monache. Ricordiamo che è possibile intervenire solamente utilizzando esche granulari a base di Metaldeide o Fosfato ferrico in prossimità delle piante, evitando di distribuire le esche direttamente sulla vegetazione.

Atrofia del capolino: dal mese di ottobre riscontriamo questa fisiopatia che non rappresenta una novità per il carciofo. Si manifesta attraverso arresto totale dello sviluppo del capolino che si presenta malformato e con stelo assottigliato nella parte terminale. Può interessare anche capolini di dimensioni quasi normali ma con brattee malformate con margine imbrunito e assenza delle spine. La fisiopatia sembrerebbe essere correlata alla mancata disponibilità del calcio durante la fase di differenziazione del capolino, a sua volta influenzata da vari fattori pedo climatici. Le note problematiche genetiche e le irrazionali pratiche colturali che producono un eccessivo rigoglio vegetativo, ad esempio l'elevato apporto di azoto, oppure un forte anticipo dei cicli colturali possono aumentare l'incidenza dell'Atrofia. Per ridurre le perdite di produzione è necessario garantire ottimali condizioni di umidità del terreno, soprattutto durante la fase di differenziazione dei capolini, e razionalizzare gli apporti di azoto. Da prove sperimentali sono risultate efficaci le irrigazioni climatizzanti.

Olivo

Fase fenologica: invaiatura – maturazione scala BBCH 84-89

La raccolta volge al termine anche negli areali in collina dove si sono raggiunti i parametri di maturazione ottimali.

Rogna (*Pseudomonas savastanoi*):

Inevitabilmente durante la raccolta si creano microlesioni e lesioni nelle varie parti della chioma che costituiscono una via di penetrazione ed infezione per le diverse crittogramme che attaccano l'olivo ed in particolare per il batterio che genera la Rogna. Per tal motivo è opportuno eseguire subito dopo questa operazione un trattamento a base di **Sali di Rame** (solfato o ossicloruro) alle dosi indicate in etichetta. Le lesioni possono essere causate anche da grandinate e anche in questo caso bisogna intervenire tempestivamente.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*) Il rame svolge un'azione di prevenzione e cura anche nei confronti di tutte le altre crittogramme, in particolare è importante proteggere la vegetazione da nuovi attacchi di che svolge una pressione notevole nei nostri ambienti essendo la bosana molto sensibile a questo patogeno e le condizioni di umidità relativamente elevate e temperature miti fattori predisponenti per la diffusione della malattia.

In alternativa è possibile utilizzare prodotti a base di *Bacillus subtilis*, che svolge un'azione di contrasto biologico alle principali crittogramme (antagonista naturale).

Terminata la raccolta inizia il **periodo delle potature**, in particolare nelle zone litoranee dove difficilmente si va incontro a periodi di freddo eccessivo con temperature sotto 0°C.

A breve partirà anche l'attività di formazione e se ne darà comunicazione nel sito istituzionale <https://www.agenzialaore.it/servizi/formazione/>.

I nostri tecnici rimangono a disposizione per eventuali consulenze e informazioni.



Fragola

Fase fenologica : fioritura, allegagione, ingrossamento



Nei tunnel a causa delle escursioni termiche, possono verificarsi fenomeni di elevata umidità relativa e presenza di condensa, creando le condizioni per lo sviluppo delle principali malattie crittomiche.

Consigliamo quindi durante il giorno di effettuare la parziale apertura dei tunnel per garantirne la ventilazione.

Tripide (*Frankliniella occidentalis*): Consigliamo di monitorare la coltura verificando la presenza di adulti e neanidi nei primi fiori, in modo da intervenire con tempestività al bisogno, con principi attivi sistemicci e di contatto registrati tra quelli inseriti nel D.P.I. della Regione Sardegna 2024

Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*): Per via dell'attuale andamento stagionale si possono verificare le condizioni predisponenti la malattia. Si consiglia di monitorare attentamente la coltura per valutare un trattamento alle prime avvisaglie con uno dei principi attivi registrati, inseriti nel D.P.I. della Regione Sardegna.

Necrosi del colletto e del rizoma (*Phytophthora cactorum*):

Le piante colpite manifestano avvizzimenti con necrosi del colletto e della corona che sezionati appaiono imbruniti totalmente o in parte.

Applicare antiperonosporici con sistemica sia acropeta che basipeta registrati per la coltura.

Concimazioni: in questa fase, in fertirrigazione consigliamo concimi con rapporto N-P-K-CaO-MgO vicino a 1,4 - 0,7 - 1,9- 0,8- 0,1+ ferro chelato eddha, distribuendo non più di 1 g/litro a seconda del tipo di acqua di irrigazione.

In fertirrigazione utilizzare sempre concimi idrosolubili atti allo scopo.

Pomodoro da mensa in serra

Fase fenologica: allegagione ingrossamento

Peronospora del pomodoro (*Phytophthora infestans*): Lo sviluppo vegetativo e l'elevata umidità relativa creano condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, per cui dove siano presenti i sintomi dell'infezione, intervenire tempestivamente con un prodotto curativo abbinato ad uno di copertura.

Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*): Si consiglia l'installazione di trappole a feromoni di controllo per rilevare la presenza dei maschi e in presenza di mine fogliari, suggeriamo di utilizzare uno degli insetticidi indicati nel Disciplinare di Produzione Integrata pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. Nella difesa contro questo insetto la rotazione di diversi insetticidi è fondamentale per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

Afidi e aleurodidi: Le temperature più elevate in serra e lo sviluppo vegetativo sono favorevoli agli attacchi di questi insetti. Si consiglia di verificarne la presenza nella pagina inferiore delle foglie e nei germogli ed eventualmente trattare con prodotti sistemici o translaminari registrati sulla coltura.

Eriofide del pomodoro (*Aculops lycopersici*): Questi acari si manifestano con una colorazione bronzea del colletto e delle foglie basali che si estende lungo il fusto verso la parte aerea, i sintomi vengono spesso confusi con alcune patologie fungine.

In caso di infestazione accertata ricorrere ad uno dei principi attivi inseriti nel D.P.I. 2025 della Regione Sardegna.

Concimazioni: in questa fase, applicando la fertirrigazione, consigliamo concimi con rapporto N-P-K-CaO-MgO vicino a 1,5 - 0,5 - 1,9 - 0,9 - 0,2 + microelementi ferro chelato EDDHA, distribuendo non più di 1,3 g/litro a seconda del tipo di acqua di irrigazione.

Nell'apporto di N ammoniacale si consiglia di non superare il 20% sul totale di N.

L'apporto del calcio è consigliato, in quanto una sua carenza assieme ad altri fattori concomitanti, potrebbe creare futuri problemi di marciume apicale e piegatura del palco fiorale.



Cetriolo in serra

Fase fenologica: allegagione ingrossamento

Consigliamo applicare nelle aperture laterali opportune reti anti-insetto come prevenzione per evitare l'ingresso di afidi aleurodidi e altri fitofagi e di favorire una buona areazione al livello del colletto evitando ristagni di umidità per scongiurare futuri problemi di sclerotinia e botrite.

Peronospora: lo sviluppo vegetativo e l'elevata umidità relativa creano condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, per cui dove siano presenti i sintomi dell'infezione, intervenire tempestivamente con un prodotto curativo abbinato ad uno di copertura.

Oidio: Lo sviluppo vegetativo e l'elevata umidità relativa creano le condizioni ottimali per lo sviluppo di tale malattia che si manifesta prima con piccole macchie sulla pagina inferiore che col tempo crescono passando anche alla pagina superiore, diventando grosse macchie bianche che confluiscono tra loro per ricoprire l'intera superficie fogliare o intere porzioni vegetali.

Consigliamo di monitorare attentamente la coltura intervenendo alle prime avvisaglie con un prodotto curativo abbinato ad uno di copertura.

Sarebbe anche opportuno effettuare la potatura delle foglie basali per favorire penetrazione della luce e migliore areazione.

Concimazioni: in questa fase, applicando la fertirrigazione, consigliamo concimi con rapporto N-P-K-CaO-MgO vicino a 1,5 - 0,5 - 1,8 - 0,9 - 0,3 + microelementi ferro chelato EDDHA, distribuendo non più di 1,3 g/litro a seconda del tipo di acqua d'irrigazione utilizzata. Nell'apporto di N ammoniacale si consiglia di non superare il 20% sul totale di N. In fertirrigazione utilizzare sempre concimi idrosolubili atti allo scopo.

Si consiglia di evitare stress idrici e eccessi di conducibilità che determinano facilmente deformazioni dei frutti e restringimenti all'apice.





Patata

Fase fenologica: formazione e maturazione tuberi

Tignola della patata (*Phthorimaea operculella*): nelle coltivazioni a ciclo intercalare, dove le condizioni lo consentono, siamo in prossimità della raccolta. Nelle stazioni di monitoraggio non rileviamo la presenza di adulti, e non è possibile valutare se le larve dell'ultima generazione autunnale riusciranno a raggiungere i tuberi in maturazione. Al momento della prossima raccolta rimangono valide le norme classiche di profilassi per evitare le infestazioni in magazzino: stoccare tuberi non infestati, disinfestare con cura i locali e dotare le prese d'aerazione di reticelle anti-insetti. Raccomandiamo inoltre la conservazione dei tuberi in cella frigo a 4-5 °C per favorirne l'invecchiamento stabilizzante ed evitare il pre-germogliamento.

Peronospora (*Phytophtora infestans*): nel nostro areale la malattia è ancora presente e localmente l'umidità elevata e la temperatura ne favoriscono lo sviluppo, specie nei campi non trattati. Nei campi tardivi consigliamo di intervenire con un prodotto rameico associato ad una sostanza attiva citotropica o sistemica, ripetendo il trattamento dopo 8 – 10 giorni.



CEREALI

(grano duro, orzo, avena e triticale)

Lavorazioni preparatorie

Stante le recenti e abbondanti piogge, i lavori preparatori per la semina sono stati sospesi da più di 20 giorni e in molti casi neppure iniziati. Stante il bel tempo in corso si consiglia di intervenire al più presto possibilmente con interventi di minima lavorazione, usando tiller o dischiera, per accorciare i tempi di messa a coltura.

Concimazione

Le abbondanti piogge hanno certamente lisciviato parte dell'azoto solubile presente nei terreni sia lavorati che non determinando presumibilmente una scarsa disponibilità azotata, pertanto si consiglia di apportate almeno 25 – 30 unità di azoto per ettaro alla semina per accompagnare le prime fasi di sviluppo della coltura.

Si consiglia inoltre l'apporto di 45 (orzo e avena) o 60 (grano e triticale) unità di fosforo per ettaro.

Notizie

Sul sito della regione Sardegna sono disponibili i **Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna per l'anno 2025** (aggiornati il 01/04/2025).

Ecco il link dove poterli consultare, scaricare e visionare gli eventuali aggiornamenti:

<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandì-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/174238891832963>

Previsioni del tempo

A cura di Arpa Sardegna

Previsioni per venerdì 19 dicembre 2025

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in locale lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mari: mossi, localmente molto mossi i bacini meridionali.

Previsioni per sabato 20 dicembre 2025

Cielo irregolarmente nuvoloso, con deboli rovesci sul settore meridionale e orientale.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: deboli da Est.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in particolare nella giornata di lunedì.

Le temperature si manterranno stazionarie domenica, mentre le massime saranno in diminuzione sul versante occidentale e in aumento in quello orientale il giorno successivo. I venti soffieranno deboli da est sud-est con locali rinforzi, per ruotare dai quadranti occidentali lunedì. I mari saranno mossi o molto mossi.