



Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupp in agricultura



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BAMSar

Bollettino Agro-Meteo della Sardegna

Bollettino n. 1 del 2026

Periodo validità: 24 - 30 luglio 2026

Area G

ZONA DI VIGILANZA ARPAS - Logudoro

Montiferru - Montacuto - Meilogu-Sassarese-Anglona - Nurra

Indice Colture

OLIVO

VITE

ANGURIA

CARCIOFO

MELONE

POMODORO



Fasi fenologiche

Ingrossamento del frutto

Maturazione frutto

Afidi su anguria



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flupyradifurone	4D	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			

Aleurodidi su anguria



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Fare attenzione ai periodi di carenza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina A	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flonicamid	29	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Ragnetto rosso su anguria



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Fare attenzione ai periodi di carenza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Abamectina		6	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Beauveria bassiana		BM02	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Exitiazox	10A	RC	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			

CARCIOFO



Fasi fenologiche

Emergenza

Premergenza - quiescenza



**Pratiche
agronomiche**

- Impiegare materiale di propagazione sano

**Indicazioni Tecniche
(generalì coltura)**

In alcuni areali sono in corso i trapianti degli ovoli. Nell'impianto della carciofaia, prestare attenzione nella scelta del materiale di propagazione evitando di reperirlo in impianti che hanno avuto problemi fitosanitari nella

precedente annata.

MELONE



Fasi fenologiche

Ingrossamento del frutto

Maturazione frutto

Afidi su melone



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Prestare attenzione agli intervalli di
sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina A	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flonicamid	29	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Aleurodidi su melone



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Prestare attenzione agli intervalli di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Azadiractina A	Sconosciuto	Sconosciuto	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flonicamid	29	NT	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sulfoxaflor		4C	

Peronospora del melone



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nonostante le elevate temperature diurne, rileviamo infezioni attive, specie in condizioni di bagnatura fogliare mattutina. In presenza di sintomi mantenere la copertura antiperonosporica, prestando attenzione all'intervallo di sicurezza della s. a.

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Fluopicolide	43	B5	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Mandipropamid	40	H5	

Ragnetto rosso su melone



Scelta fitosanitaria

Alta pressione dell'avversità

Livello rischio

ALTO

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Prestare attenzione agli intervalli di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Abamectina		6	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Exitiazox	10A	RC	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			

Fasi fenologiche

2a fase ingrossamento drupe



Pratiche agronomiche

- Spollonatura

Indicazioni Tecniche (generali coltura)

Il perdurare dell'ondata di caldo con temperature superiori ai 32°C può provocare rallentamenti nella fotosintesi in particolare negli oliveti condotti in asciutto con conseguente ritardo nello sviluppo dei frutti e dei nuovi germogli.

Mosca dell'olivo



Scelta fitosanitaria

Condizioni ambientali sfavorevoli

Scelta fitoiatrica

Intervento NON consigliato

**Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)**

Nelle strategie di lotta alternativa alla mosca con repellenti naturali (caolino, zeoliti ...) provvedere al trattamento di copertura della chioma associando alla polvere il rame sia per potenziare l’azione repellente sia per l’azione anticrittogamica

Pratiche agronomiche

- Monitorare la dinamica della popolazione adulta ed in particolare delle femmine



Fasi fenologiche

Invaiaatura 2° palco

Maturazione 2° palco

Tignola del pomodoro



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Raggiunta soglia di intervento

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento consigliato

Indicazioni tecniche
(specifiche avversità)

Nelle stazioni di monitoraggio la presenza dell’insetto è costante, consigliamo di intervenire utilizzando insetticidi endoterapici specifici oppure Bacillus thuringiensis. Vista la fase fenologica, valutare con cura l'intervallo di sicurezza (PHI).

Sostanze Attive Consigliate

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	

Sostanze Attive Alternative

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	

Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Fasi fenologiche

Invaiaatura



Cicaline della vite



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Flupyradifurone	4D	NT	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Olio essenziale di arancio dolce			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Sali potassici di acidi grassi			

Oidio della vite



Scelta fitosanitaria	Condizioni ambientali sfavorevoli
Scelta fitoiatrica	Intervento NON consigliato

Fascia costiera (<90 mslm)



Scelta fitosanitaria

Bassa pressione dell'avversità

Scelta fitoiatrica

Intervento NON consigliato

Tignola rigata



Scelta fitosanitaria

Effettuare monitoraggio aziendale:
Sintomi visibili

Livello rischio

DA VALUTARE in azienda

Scelta fitoiatrica

Intervento Consigliato

Sostanze Attive Consigliate			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Clorantraniliprole	28	NT	

Sostanze Attive Alternative			
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Bacillus thuringiensis	11A	CEI	
Sostanza Attiva	Codice MOA	Gruppo MOA	Biologico/Integrato
Emamectina benzoato	6	NT	

Link Utili

Arpa Sardegna

Portale regionale che offre accesso online a servizi amministrativi e pratiche digitali, semplificando i procedimenti e promuovendo trasparenza e digitalizzazione per cittadini, imprese e istituzioni.

Guida all'uso dei prodotti fitosanitari

Fornisce indicazioni per un impiego sicuro e responsabile dei fitosanitari, promuovendo la tutela della salute, dell'ambiente e la gestione sostenibile delle colture.

Controlli funzionali e regolazione delle macchine irroratrici

Disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature per l'applicazione dei fitosanitari, assicurando efficienza, sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.

Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Certifica pratiche agricole sostenibili attraverso regole e controlli che limitano l'uso di prodotti fitosanitari e garantiscono qualità, sicurezza alimentare e tutela ambientale.

Disciplinari di Produzione Integrata Sardegna 2026

Definiscono le norme tecniche per una gestione agricola sostenibile, regolando fertilizzazione, difesa fitosanitaria e pratiche colturali per ridurre l'impatto ambientale e assicurare produzioni di qualità.

Legenda tipologia sostanze attive



Sostanze attive ammesse in Agricoltura Biologica



Sostanze attive ammesse in Produzione Integrata